

ti Begti Begti Be

(外用)

“生達” 百吉 乳膏

“Standard” BEGTI Cream

百吉乳膏，是一種廣效性的局部皮膚治療劑，主成分包含著四種不同藥理作用的藥物，具有抗炎、殺菌、與殺黴菌等作用，對於各種皮膚疾患及致病原因不明之皮膚病，皆有療效。

主 成 分：每公克含：

Betamethasone 17-Valerate.....	0.5mg
Gentamycin Sulfate equ. to Gentamycin Base	1mg(potency)
Tolnaftate.....	10mg
Iodochlorhydroxyquin.....	10mg

- 藥理作用：
1. Betamethasone 17-Valerate: 目前效力最卓越，供局部使用之固醇類，具有顯著的抗炎、抗過敏、止癢等作用。
 2. Gentamycin Sulfate: 廣效性抗生素，對於感染在皮膚之病原菌，具有強力殺菌之功效。
 3. Tolnaftate: 強有效的局部殺黴菌劑，作用安全迅速。
 4. Iodochlorhydroxyquin: 衆所週知之化學療法劑具有殺黴菌及殺菌之作用，對於G(+)菌屬及Candida albicans，具有明顯之療效。

適 應 症：濕疹或皮膚炎、急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染，治療皮膚表淺性黴菌感染，如：足癬（香港腳）、股癬、汗斑。

功 效：百吉乳膏，可治療各種濕疹及其他發炎性、過敏性皮膚炎、續發性細菌或念珠菌等黴菌之感染，包括濕疹樣皮膚炎、神經性皮膚炎、接觸性皮膚炎、細菌性皮膚炎、四肢慢性皮膚炎、溢脂性皮膚炎、對光敏感性皮膚炎、紅癬、帶狀疱疹、枕骨帶狀疱疹、膿疱性痤瘡、鼠蹊皮膚病、苔癬化鼠蹊皮膚菌病。黴菌感染如股癬、足癬、體癬以及甲溝炎、皮膚搔癢症。

用法用量：將本品適量塗擦於患部，每天2~3次，治療時間，可依病況而定，足癬之治療可能要2~4星期。醫師藥師藥劑生指示藥品

- 注意事項：
1. 須置於小孩接觸不到之處。
 2. 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
 3. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
 4. 勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。
 5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四週或黏膜。
 6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。

7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。
11. 黴菌治療至少二星期，使用此藥須完成全程療程。
12. 一般黴菌治療一星期症狀會改善，股癬和體癬經二星期，足癬經四星期治療症狀若沒有改善應停藥立即就醫，即使若症狀有改善停藥後若病情復發應停藥立即就醫。
13. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，類固醇抗發炎劑，不可連續使用超過二星期。
14. 本品不得使用於天花、水痘、皮膚結核、急性單純疱疹等症。
15. 請儲存於30°C以下。

副作用： 1. 局部皮膚刺激及灼熱感。

2. 過敏性皮膚炎。
3. 紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。
4. 局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘡子、毛細管擴張。
5. 全身性：庫欣氏症候群（Cushing's syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等）
繼發性腎上腺功能不足（secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等）。

警語： 1. 對藥物各成分過敏者不得使用。
2. 長期使用有可能引起繼發性感染。
3. 會使衣物染色。
4. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
5. 癬類或其它皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
6. 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
7. 皮膚的黴菌感染有時不易與其它皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難

包裝： 3公克，5公克，10公克，15公克管裝，100公克，150公克，450公克罐裝。

衛署藥製字第020998號 Code No. OB-01 3216010



GMP藥廠 · ISO 9001
 生達化學製藥股份有限公司二廠
 STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
 台灣省台南縣新營市開元路154號