

herp Deherp Dehe

外用

"生達"

疱寧[®] 乳膏 5%
(艾賽可威)

DEHERP[®] Cream 5%
(Acyclovir)

"Standard"

"生達"疱寧乳膏是本公司經過不斷研究開發所產生的心血結晶，其主成份Acyclovir能選擇性作用在受病毒感染細胞上，經由病毒所特有的Thymidine kinase將Acyclovir磷酸化成 Acyclovir monophosphate，再進一步轉變形成 Acyclovir diphosphate 及 Acyclovir triphosphate，然後干擾單純疱疹病毒的DNA聚合酶，進一步產生抑制病毒DNA複製的作用，本品對於單純疱疹病毒的感染具有理想的療效，誠為治療疱疹患者的最佳選擇用藥。

【主 成 分】：每公克含：

Acyclovir.....50mg

- 【作用特點】：
- 1.本品具有高度選擇性，對於未受病毒感染的正常細胞並無影響。
 - 2.本品毒性相當低，誠為治療病毒性感染的最佳選擇用藥。
 - 3.由生體外試驗，顯示本品對於單純疱疹病毒I型、II型及水痘帶狀病毒均有相當高的抑制活性。
 - 4.本品可抑制病毒在寄主細胞中的複製，而加速治癒作用及快速緩解疼痛。

【適應症】：單純疱疹病毒引起之皮膚感染。

- 【用法用量】：
- 1.本藥須由醫師處方使用。
 - 2.取適量塗敷於患部，通常每4小時塗一次，一天5次，連續使用5天。如未痊癒，則可連續使用10天。

- 〔注意事項〕**：1.本品僅供皮膚外用，勿使用於眼睛及黏膜。
2.對本品過敏之患者，禁用。
3.使用本品之劑量、次數及治療時間請勿超過推薦之用法用量。
4.本品與其他局部或全身性作用之藥物併用，未知有交互作用產生。
5.無充分資料指出使用本品對孕婦及胎兒之影響，以及使用本品後乳汁中Acyclovir之濃度。因此孕婦及授乳婦女宜審慎評估利弊後再使用本品。

〔副作用〕：使用本品後，可能發生短暫之灼熱感或刺痛，有小部分之病人曾有紅斑或輕微乾燥、皮膚剝落之報告。

〔包裝〕：1000公克以下塑膠瓶、鋁管裝。
儲存於25℃以下之乾燥處。

衛署藥製字第038288號 G-4540 LT-OD04 3216250



GMP中藥廠 • ISO 9001
生達化學製藥股份有限公司二廠
台灣省台南縣新營市開元路154號