

S.Z. S.Z. S.Z. S.Z.

"生達"

外用

# 舒疹 乳膏

0.5公絲 / 公克 (可洛貝他素)

S.Z. Cream 0.5mg/g (Clobetasol)  
"Standard"

舒疹乳膏為一種強效性的局部皮膚病治療劑，其主成分Clobetasol propionate係合成的氟化腎上腺皮質類固醇。

本品具有強力的抗炎、止癢及收縮血管的作用，且對皮膚的穿透性極佳，能迅速解除中症至重症的皮膚發炎、搔癢等現象。

成分：每gm含

Clobetasol propionate.....0.5mg

作用特點：1.為強效性的腎上腺皮質類固醇製劑。  
2.具有迅速抗炎、止癢的功效。

適應症：牛皮癬、濕疹、扁平苔癬、盤狀紅斑狼瘡。

用法用量：1.將本品以薄膜狀，輕輕地塗抹於患處，每天1~2次。  
2.以本品治療，在臨床上已獲改善，則可停止本品之治療，改以效力較溫和之局部皮質類固醇製劑取代之。  
3.使用本品每週劑量應不可超過50g，且治療期通常不要超過二週。  
4.使用本品勿以繃帶包紮塗抹之患處。  
本藥須由醫師處方使用。

注意事項：1.本品與其他局部腎上腺皮質類固醇一樣，具有可能相似的副作用。  
2.本品是目前使用中最強效的局部腎上腺皮質類固醇製劑之一，因此能抑制HPA軸（下視丘—腦下垂體—腎上腺軸線）  
3.儘可能避免長期持續使用，尤其是嬰兒及孩童。  
4.通常本品不推薦用於12歲以下之孩童，因為孩童的表面積與體重比大於成人，因此使用局部腎上腺皮質類固醇後，產生HPA軸抑制及Cushing's Syndrome（庫欣氏徵候群）的感受性較大。

5. 避免觸及眼睛，如果接觸到眼睛，則以大量水沖洗之。
6. 塗抹本品之患處，勿使用繃帶包紮或用其他方法覆蓋、包裹而將之封閉。
7. 於本品治療期間若發生二次感染時，則應該適當地加入抗黴菌劑或抗黴菌劑治療。若有任何蔓延性的感染，應停止使用局部腎上腺皮質類固醇療法，而服用全身性抗黴菌劑。
8. 局部腎上腺皮質類固醇不應大量或長期使用於孕婦或授乳婦。

**禁忌症：**

1. 本品與其他局部腎上腺皮質類固醇一樣，禁止使用於酒渣鼻，尋常性痤瘡，口周圍性皮膚炎，原發性皮膚濾過性病病毒感染（例如：水痘、單純性疱疹）。
2. 禁用於對本品或其他皮質類固醇過敏的病人。
3. 本品不適用於治療由黴菌或細菌感染所引起的原發性皮膚感染症。
4. 本品亦不適用於一歲以下幼兒之皮膚病，包括皮膚炎及尿布疹。

**副作用：**

1. 本品以二週為治療期時，通常都具有良好的耐受性（不易產生副作用）。
2. 和其他局部腎上腺皮質類固醇一樣，若長期大量地使用於廣泛的部位，則可能會因足夠的全身性吸收而產生腎上腺皮質機能亢進的現象，此種作用較可能發生於嬰兒及孩童。
3. 長期及密集地使用強效性腎上腺皮質類固醇，可能會造成皮膚局部萎縮性變化，例如皮膚變薄，產生皺紋及表皮血管的擴張，尤其是採用封閉包紮或患部發生在皮膚皺褶處時。
4. 本品較常見的副作用為局部的，有灼熱感（4/421人）及刺痛感（3/421人），另較少見的有癢、皮膚萎縮、皮膚皸裂等。（摘自PDR44版）

**藥物貯存：**請貯藏於30°C以下，且勿冷凍貯藏。

**包裝：**1kg以下管裝及瓶裝。

衛署藥製字第035680號

G-3167 Code No. OS-06 3216190



GMP藥廠 · ISO 9001

生達化學製藥股份有限公司二廠

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台灣省台南縣新營市開元路154號

80  
89  
88