

Shielin Shielin Shielin

外用

速備粉

Shielin Powder

本公司出品之速備粉是由抗生物質Neomycin，加配以壞死組織溶解劑而有佳評的“結晶”Trypsin所製成之撒布劑，由於兩種成分的互相協調作用得以發揮理想的治療效果。Neomycin的抗菌性非常廣泛，對Gram陽性菌、Gram陰性菌、放線菌、結核菌等具有強力的作用，尤其對於那些對Chloramphenicol或Tetracycline等呈耐性的赤痢菌、綠膿菌、變形菌及大腸菌等之作用比他種抗生物質為強。結晶Trypsin為蛋白分解酵素、對面部壞死組織、凝血、膿等有溶解作用，在治療效果上得到很高的評價。

成分：本劑1公克含有：

Neomycin Sulfate10mg(Potency)
Trypsin Crystallized2500units(1mg)

特長：1. Trypsin具有壞死組織溶解作用，能促進創面的清淨，而增加Neomycin之浸透力。
2. Neomycin為廣泛的抗菌作用，對他種抗生素無效之病例，使用本劑常能呈顯著效。
3. 不易引起過敏性反應、局部刺激極少。
4. 使用方便、能依需要而斟酌調整投與量，無變質及力價低下之虞。
5. Trypsin對潰瘍、糜爛的療效特別顯著。

適應症：膿炎、傳染性膿皮症、膿瘍、癬、疔、癰疽、腋臭、外傷、火傷、皮膚移植後感染。

用法用量：將適量均勻地撒布于局部，於婦產科領域，可使用受器就能充分地撒布于腔內，使用量通常以1公克為標準。

本藥須由醫師處方使用

包裝：2公克×200包盒裝，5公克，7.5公克，10公克瓶裝。

衛署藥製字第004761號 Code. No. PS-01 2219040



GMP藥廠 · ISO 9001

生達化學製藥股份有限公司
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台灣省台南縣新營市土庫里六號之二十