

外用

“生達”
優 樂 乳 膏

Urealoe Cream “Standard”

濕疹（或稱為皮膚炎）係最常見的皮膚疾病之一，其特徵為皮膚呈紅色並蔓生丘疹及水疱且伴隨有癢感；當轉為慢性時，皮膚會變得粗厚，同時角質化增加，並產生大量的鱗屑。本品的有效成分：Hydrocortisone為抗發炎類固醇；Urea為角質溶解劑，能軟化且剝離角質，使乾裂粗糙的皮膚柔嫩。除此之外，本品尚含有天然蘆薈（Aloe Vera），能促進Hydrocortisone滲透角質層以發揮療效。

成 分：每公克含：

Hydrocortisone acetate.....10mg
Urea.....100mg

適 應 症：濕疹或皮膚炎、去角質。

用法用量：通常每日1-2次，取適量的本品塗抹於患部。
醫師藥師藥劑生指示藥品。

副 作 用：1.局部性：搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、瘵子、毛細管擴張。
2.全身性：庫欣氏症候群(Cushing's syndrome，如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)、繼發性腎上腺功能不足(Secondary adrenal insufficiency，如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

警 語：1.對藥物各成分過敏者不得使用。
2.小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
3.癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。
4.臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇，容易出現局部皮膚萎縮。
5.皮膚的黴菌感染，有時不易與其他的皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化，並造成日後診斷及治療之困難。

注意事項：1.須置於小孩接觸不到之處。
2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
3.除非藥師、藥劑生或醫師指示，兒童、孕婦及授乳婦不建議自行使用。
4.勿超過建議劑量，若有副作用產生，應立即停藥就醫。

5. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑限於皮膚外用不得內服，或使用於眼睛內，亦不得施於眼睛四周或黏膜。
6. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，本製劑勿使用於大面積之體表或皮膚深部感染。
7. 使用後自覺狀況未改善或更惡化，應立即停藥並就醫。
8. 除非藥師、藥劑生或醫師指示，使用皮膚外用藥後請勿覆蓋，以免增加副作用。
9. 塗抹皮膚外用藥後應徹底洗淨雙手後，再戴隱形眼鏡。
10. 深部皮膚組織感染請就醫治療。
11. 除非有藥師、藥劑生或醫師指示，非類固醇抗發炎藥，不可連續使用超過二星期。

包裝：1000公克以下塑膠管或塑膠瓶裝。

衛署藥製字第041801號 G-6092 Code No. OU-01 3216320



GMP藥廠 · ISO 9001

生達化學製藥股份有限公司二廠

STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.

台灣省台南縣新營市開元路154號