

Staderm Standard

發炎性黴菌感染治療劑

(外用)

“生達” 舒 爽 乳膏

Staderm cream "Standard"

“生達”舒爽乳膏，含有兩種主要成分，Econazole Nitrate是抗黴菌感染劑，其治療範圍極為廣泛，包括由皮膚真菌群(Dermatophytes)，酵母菌群(Yeasts)及其他黴菌群(Molds)等所引起之黴菌感染症，同時對於革蘭氏陽性菌，如葡萄球菌、鏈球菌、炭疽桿菌，亦有殺菌及抑制作用。Triamcinolone Acetonide是一種類固醇製劑，具抗過敏、抗感染及抑制搔癢之作用，療效佳。

主 成 分：每公克含

Econazole Nitrate..... 10 mg
Triamcinolone Acetonide..... 1 mg

特 點：(一)殺菌力強、治療範圍廣泛：對於各種黴菌及G(+)細菌所引起之皮膚病，都有良好之療效。
(二)可迅速消除發紅、搔癢、流膿等現象。
(三)對其他藥品治療具有抗藥性或再發性者亦有效。
(四)治癒率高，幾無過敏反應，耐受性佳。
(五)本品係乳膏基劑，不油膩、不污染皮膚或衣物。

適 應 症：真菌群、酵母菌群、黴菌群及革蘭氏陽性細菌混合感染所引起之皮膚和指甲感染症：如香港腳(足癬)、禿髮癬、圓癬、紅癬、股癬、灰指甲、汗斑、濕疹性黴菌病、輪廓性濕疹、尿布疹、發炎性皮膚炎、毛囊炎、鬚瘡。

用法用量：將本品少量塗擦於患處，且按摩使之完全滲入皮膚為止，每天早晚各塗擦一次，可隨症狀適宜增減之。本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1.一般注意事項

- a.原則上伴有皮膚感染的濕疹，皮膚炎不要使用，但萬不得已非使用不可時，事先要考慮用適切的抗菌劑(全身適用)、抗真菌劑施行治療，或者是和這些併用。
- b.大量或者是經長期廣範圍的密封法(ODT)等的使用時會引起和全身投與副腎皮質Steroid劑後同樣的症狀。

2. 禁忌

- a. 皮膚結核、單純疱疹、水痘、帶狀疱疹、種痘疹。
- b. 對本劑曾有過敏症病歷之患者。
- c. 對鼓膜有穿孔性的濕疹性外耳道炎。
- d. 潰瘍 (Behcet病除外)，第二度深在性以上的熱傷、凍傷。

3. 副作用

- a. 有時會出現皮膚感染症：如有皮膚真菌性(念珠菌症、白癬等)及細菌性(傳染性膿痂疹、毛囊炎等)，(軟膏的密封法(ODT)之場合時較易發生)等症狀出現時，要適切的併用抗真菌劑、抗菌劑等，且症狀如無迅速改善時要中止投與。
 - b. 其他的皮膚症狀：長期連用時，會出現Steroid痤瘡(類似尋常性痤瘡，但有白色的面皰為多之傾向)。Steroid rosacea也就是口圍皮膚炎(口圍或有時臉部全體會產生紅斑、丘疹、毛細血管擴張、痂皮、鱗屑)，Steroid皮膚(皮膚萎縮、毛細血管擴張)，或者會產生魚鱗樣的皮膚變化，紫斑、多毛 及有時會出現色素脫失等現象。這時要慢慢的控制它的使用，並改成無含副腎皮質Steroid之藥劑。
 - c. 過敏症：出現皮膚之刺激感，發疹等過敏症狀時要中止投與。
 - d. 下垂體，副腎皮質系機能：大量或者是經長期廣範圍的使用，軟膏密封法(ODT)的使用時，會引起下垂體，副腎皮質系機能之抑制，所以要注意。
 - e. 眼：①大量或長期使用或使用密封法後可能會引起白內障。
②使用在眼瞼皮上時會引起眼壓升高，故要注意。
4. 對妊婦的使用：對妊婦的安全性尚未確立，所以對於妊婦及有妊娠可能的婦人要避免大量或者是長期的使用。
5. 對乳兒、小兒的使用：長期、大量使用，或者是軟膏密封法(ODT)使用時，恐怕會招來發育障害。
6. 適用上的注意：只能用於皮膚，不可用於眼睛內的使用。
7. 室溫保存，請存於30°C以下。

包裝：450gm以下管・罐裝。

衛署藥製字第026554號 Code. No. OS-02 3216100



GMP藥廠 · ISO 9001
生達化學製藥股份有限公司二廠
STANDARD CHEM. & PHARM. CO., LTD.
台灣省台南縣新營市開元路154號